



RILASTIL
LABORATORIO DERMATOLOGICO

ACNESTIL CREMA



**AUMENTA L'EFFICACIA E LA
TOLLERABILITÀ DEL TRATTAMENTO
TOPICO FARMACOLOGICO**

MILANO | ITALY

Materiale destinato agli operatori sanitari

PREVALENZA DELL'ACNE

Nei paesi industrializzati occidentali la prevalenza dell'acne negli adolescenti è tra il **50%** ed il **95%**. L'acne può persistere oltre l'adolescenza in una proporzione significativa di individui, in particolare le donne.*


*Guideline on the Treatment of Acne

Developed by the Guideline Subcommittee "Acne" of the European Dermatology Forum - 06/2016.



Immagini tratte da: Lawrence F. Eichenfield, Andrew C. Krakowski, Caroline Piggott, James Del Rosso, Hilary Baldwin, Sheila Fallon Friedlander, Moise Levy, Anne Lucky, Anthony J. Mancini, Seth J. Orlow, Albert C. Yan, Keith K. Vaux, Guy Webster, Andrea L. Zaenglein and Diane M. Thiboutot- Evidence-based recommendations for the diagnosis and treatment of pediatric acne - Pediatrics 2013;131;S163

EVENTI BIOLOGICI DETERMINANTI LE LESIONI ACNEICHE



Il trattamento topico ottimale per contrastare e prevenire le lesioni acneiche deve agire in modo mirato, contrastando questi eventi.

ACNE

RILASTIL ACNESTIL CREMA

Trattamento seboregolatore, cheratolitico e lenitivo con antimicrobico.

- In associazione al farmaco.
- In monotrattamento in caso di sospensione del farmaco o di acne lieve.

Non fotosensibilizzante
Non fotoirritante



50 ml



0% PROFUMO
COLORANTI
DERIVATI DEL GRANO

QUADRO CLINICO	ATTIVI
IPERCHERATOSI	 <p>SODIO SALICILATO: azione esfoliante NIACINAMIDE: azione stimolante il turnover dell'epitelio dello sbocco duttale</p>
IPERSEBORREA	 <p>NIACINAMIDE E AZELOGLICINA: azione seboregolatrice</p>
COLONIZZAZIONE BATTERICA	 <p>OLIGOPEPTIDE 10 CLOREXIDINA DIGLUCONATO: azione antimicrobica</p>
INFIAMMAZIONE	 <p>DIPOTASSIO GLICIRRIZINATO VITAMINA E: azione lenitiva</p>

CONTIENE INOLTRE

ACIDO IALURONICO
PANTENOLO

Azione idratante

STUDIO CLINICO OSSERVAZIONALE MULTICENTRICO RILASTIL ACNESTIL CREMA

Efficacia e tollerabilità dell'associazione tra Rilastil Acnestil Crema e Adapalene vs Adapalene in monotrattamento in pazienti con acne lieve e intermedia.

Prof.ssa Fabbrocini*, Prof. Micali** e Prof. Veraldi***

* Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Napoli

** Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Catania

*** Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Milano



50 ml

DISEGNO DELLO STUDIO

GRUPPO A 40 PAZIENTI

PANEL

- 25 con acne lieve,
- 15 con acne intermedia.

Età media 20 anni.

TRATTAMENTO

Per 8 settimane

- Rilastil Acnestil Crema al mattino
- Adapalene 0,1% alla sera

VS

GRUPPO B 40 PAZIENTI

PANEL

- 21 con acne lieve,
- 19 con acne intermedia.

Età media 21 anni.

TRATTAMENTO

Per 8 settimane

- Adapalene 0,1% alla sera

Entambi i gruppi: Rilastil Acnestil Mousse Detergente mattina e sera


VALUTAZIONI

GAGS, sebometria e tollerabilità al tempo 0 (T0) e dopo 8 settimane (T1).

RISULTATI

GAGS - Global Acne Grading System


■ n 40 ■ n 40



Differenza statisticamente significativa a favore del gruppo Acnestil + Adapalene nella riduzione del GAGS
p < 0,05

SEBOMETRIA (Sebutape)

■ n 30 ■ n 30



Differenza statisticamente significativa a favore del gruppo Acnestil + Adapalene nella riduzione del sebo
p < 0,05

TOLLERABILITÀ

Acnestil + Adapalene

■ n 30



100%

100%

Pazienti che riferiscono **tollerabilità ottima** nel gruppo **Acnestil + Adapalene**

Adapalene

■ n 30



Scarsa
47%

Ottima
23%

Buona
30%

47%

Pazienti che hanno sviluppato una **reazione avversa** (eritema, bruciore e pizzicore) nel gruppo **Adapalene**

CONCLUSIONI

Il maggiore miglioramento (p < 0,05) sul GAGS e sulla Sebometria e la migliore tollerabilità ottenuti con Rilastil Acnestil Crema in associazione ad Adapalene rispetto al solo Adapalene suggerisce che **Rilastil Acnestil Crema migliori l'efficacia e la tollerabilità del trattamento farmacologico**, agendo sinergicamente col farmaco e favorendo il ripristino del comfort cutaneo.

MODALITÀ D'USO

ACNE LIEVE E INTERMEDIA IN ASSOCIAZIONE ALLA TERAPIA FARMACOLOGICA TOPICA

MATTINO



Mousse Detergente



Crema

- NON FOTO-SENSIBILIZZANTE
- NON FOTO-IRRITANTE

SERA



Mousse Detergente



Trattamento farmacologico topico secondo parere medico

PELLE A TENDENZA ACNEICA E ACNE LIEVE IN MONOTRATTAMENTO

MATTINO
E SERA



Gel Detergente
o
Mousse Detergente



Crema

- NON FOTO-SENSIBILIZZANTE
- NON FOTO-IRRITANTE



0%

COLORANTI
DERIVATI DEL GRANO
GAS PROPELENTE
SLES, SLS